



EMYS LUTARIA, *young.*

J.D.C. Sowerby del. E.Lear lithog.

Printed by C. Hullmandel.

## EMYS LUTARIA, *Lacep.*

Olivacea; collo pedibusque luteo striatis; testâ ovatâ, depressâ, subcarinatâ; sterno anticè truncato, posticè trigono-emarginato; capite suprà plano, laminâ unicâ glabrâ tecto; caudâ longâ, gracili, acutâ.

*Testudo lutaria.* Linn. Syst. Nat. (?)—Lacep. Quad. Ovip. t. iii. f. 1.
*Emys lutaria.* Schweig. Prod. sp. 18.—Merrem, var. β. γ. Amph. 25.
*Testudo caspica.* S. G. Gmel., Reise durch Russ. T. iii. S. 59. t. 10. 11.—Gmel. Syst. Nat. 1041.—Daud. Rept. ii. p. 124.—Schneid. Schildkr. p. 344.—Shaw, Gen. Zool. iii. p. 63.
*Emys caspica.* Schweig. Prod. sp. 21.
*Clemmys caspica.* Wagler, Icon. et Descr. Amph. f. ii. t. xxiv.
*Emys vulgaris.* Gray, Syn. p. 24.

Habitat in Hispaniâ (*Wagler*), in Asiâ occidentali, in Africâ boreali. Mus. nostr.—Mus. Brit. &c.

Descriptio. *Caput* humile, planum, collo paulò latius, pyramidale, pileo laminâ unicâ, glabrâ tecto, olivaceum, ad latera et subtùs flavo vel luteo striatum. *Oculi* lutei, lineâ transversâ, nigrâ dimidiati. *Maxillæ* integræ, acutæ. *Collum* depressiusculum, cute laxâ, granulosâ tectum, olivaceo-fuscum, lineis longitudinalibus luteis, infrà pallidius, et in nonnullis flavescens. *Pedes* robusti, compressiusculi, cute rugulosâ et anticè squamosâ tecti, olivacei, flavo lineati. *Digiti* suprà squamosi. *Ungues* compressi, acuti, subtùs excavati. *Cauda* longa, gracilis, ad basin crassa, apicem versus sensim attenuata, acuta, ruguloso-granosa, olivacea, flavo obscurè lineati. *Testa* ovata, humilis, margine integerrimo; in animali adulto olivacea, suprà obsoletè carinata; in juniori viridi-olivacea, rufo et luteo variegata, et ruguloso-tricarinata. *Scuta dorsalia* in adulto glabra, in pullo rugosa: *vertebralia* paulò elevata; primum pentagonum, medio elevatiusculum; secundum et tertium ferè plana, hexagona,